

PIWIS:

Welche Augen an welchem Internodium sind fruchtbar?

Die verschiedenen Piwis tragen die Trauben an unterschiedlichen Augen des Triebes.


Bei manchen Sorten führt dann ein zu starker Rückschnitt der Rute zum Minderertrag, da die Fruchtbarkeit auf den unteren Augen schlechter ist oder die zweite Traube erst „zu hoch“ kommt.

Das kommt z.B. zum Tragen, wenn mit zwei kurzen Halbbogen, im **Kordon** oder mit **Minimalschnitt im Spalier** erzogen werden soll.


Wir haben dies daher 2022 in unseren Vergleichsanlagen unter gleichen Standortbedingungen ausgezählt. Zugrunde liegen für die Auswertung jeweils die Zählungen von 100 Trieben.



Souvignier gris:




Souvignier gris




In der Regel 2 Trauben pro Trieb Muster:
am 4. und 5. oder am 4. und 6. Auge

Calardis blanc




Calardis blanc




Fast immer 3 Trauben
Muster meist 2.3. und 5. Auge

Blütenmuskateller




Blütenmuskateller




Immer 2 Trauben
Muster: Trauben am 4. und 5. Auge

Muscaris




Muscaris




Immer 2 Trauben
Muster: am 4. und 5. Auge

Sauvignac




Sauvignac




Mindestens 3 Trauben
Muster: am 2. 3. und 4. Auge

Sauvitage




Sauvitage




Meistens 3 Trauben
Muster: am 2. 3. und 5. Auge

Cabernet blanc



Cabernet blanc



Meistens 3 Trauben
Muster: am 2. 3. und 4. Auge

© Reinhard Antes September 2022

www.antes.de

